





**Quelex®:**  
Slobodno upravljajte  
svojom farmom



**Quelex®:**  
Brzo rastvaranje i ujednačena primena

- Poboljšano rastvaranje na nižim temperaturama (do 5°C).
- Skraćuje vreme pripreme tank miksa.
- Postiže se ujednačenija i efikasnija primena.




**Quelex®:**  
Kompatibilan sa  
drugim preparatima

Quelex® se meša sa fungicidima, graminicidima i drugim herbicidima za širokolisne korove.



**Quelex®:**  
Efikasan u različitim  
klimatskim uslovima

Primena efikasna na temperaturama od 2-25°C



**Quelex®:**  
Brža kontrola

Quelex® primena moguća do lista zastavičara ali uvek preporučujemo tretiranje korova što je pre moguće (2-8 listova).

Quelex® takođe vrlo brzo deluje na korove; prvi simptomi su vidljivi u roku od nekoliko dana.

*Galium aparine i matricaria – posle 20 dana*



*Fumaria – posle 14 dana*



# Quelex™

Arylex™ active

HERBICID

## Moja farma, naša budućnost



Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati etiketu. Kupujte samo autentične proizvode od ovlašćenih distributera.



## PREGLED

Quelex™ herbicid sa Arylex™ Active je novo rešenje za suzbijanje širokolisnih korova, čak i otpornih vrsta poput Prilepače (*Galium aparine*) ili bulke (*Papaver rhoeas*). Siguran je za vaš usev i nudi održiv način da vaše njive budu zdrave. Ostanite fleksibilni i ostvarite kontrolu sa plodoredom i lakom primenom u proleće.



## Quelex™ ... Fleksibilna kontrola za širokolisne korove u vašim žitaricama

### Arylex™ active

**Nova aktivna supstanca.  
Novi mehanizam delovanja.**

- Napravite razliku sa herbicidom **Quelex®** i održavajte zdravlje vaše njive zahvaljujući novoj aktivnoj supstanci Arylex™.
- **Quelex®** i njegova dva načina delovanja odlažu i smanjuju razvoj rezistentnosti korova.
- **Quelex®** pomaže u postizanju bolje kontrole širokolisnih korova i veće profitabilnosti, danas i u budućnosti.



## Quelex™: Prednosti i koristi

### Arylex™ drugačiji način delovanja Ayxina

- Niska isparljivost
- Nova hemijska grupa
- Upravljanje rezistentnošću
- Snažna kontrola tvrdokornih korova
- Nema ograničenja u plodoredu (umesto dozvoljava rotaciju...)
- Kompatibilan sa drugim pesticidima




### Quelex®: Preporučena primena

#### Ozime žitarice:

- **Pšenica, ječam, tritikale i raž** u količini od 50 g/ha, kada su ozime žitarice u fazi od početka bokorenja do kasne faze zastavičara (BBCH 21-45)
- **Ovas**: u količini od 30 g/ha, u periodu od početka bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 21-30)
- **Jare žitarice** (meka i tvrda pšenica, ječam i raž): u količini od 50 g/ha, od faze 3 razvijena lista do kasne faze zastavičara (BBCH13-45).

Utrošak vode: 100 – 400 l/ha.

### Quelex®: Optimalna faza porasta korova: 2-8 listova (visine manje od 10 cm)



EFIKASAN ZA VEĆINU ŠIROKOLISNIH KOROVA U ŽITARICAMA

### Quelex®: Spektar delovanja

EPPO ŠIFRA	NAUČNI NAZIV
ANTSS	<i>Anthemis sp.</i>
CENSS	<i>Centaurea sp.</i>
CHEAL	<i>Chenopodium album</i>
DIPVG	<i>Diplotaxis virgata</i>
GALAP	<i>Galium aparine</i>
LAMSS	<i>Lamium sp.</i>
MATSS	<i>Matricaria sp.</i>
PAPRH	<i>Papaver rhoeas</i>
RAPRA	<i>Raphanus raphanistrum</i>
SINAR	<i>Sinapis arvensis</i>

